

河南省 2010 年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试

医科类西医专业课试题卷

考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（内科护理学 1-20；外科护理学 21-40。每小题 2 分，共 80 分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1. 肺炎最常见的病原体是

- A. 细菌 B. 病毒 C. 支原体 D. 军团菌

2. 对哮喘持续状态处理错误的是

- A. 控制感染 B. 解除支气管痉挛
C. 肌肉注射吗啡 D. 纠正脱水

3. 患者，男性，50 岁，慢性支气管炎-阻塞性肺气肿病史多年，于阵咳后突然出现呼吸困难，右胸刺痛，逐渐加重。最可能是

- A. 急性心肌梗死 B. 慢性支气管炎急性发作
C. 自发性气胸 D. 支气管哮喘

4. 二尖瓣狭窄患者的面容特征是

- A. 两颊部蝶形红斑 B. 两颊部紫红，口唇轻度发绀
C. 两颊黄褐斑 D. 午后两颊潮红

5. 对冠状动脉狭窄性病变的诊断最具有确诊价值的检查是

- A. 心电图 B. 超声心动图
C. 胸部 X 线 D. 冠状动脉造影

6. 下列心律失常中，治疗首选心脏电复律方法的是

- A. 频发室早 B. 室颤 C. 预激综合征 D. 病窦综合征

7. 慢性胃炎最主要的病因是

- A. 幽门螺杆菌感染 B. 非甾体类消炎药
C. 烟酒等不良嗜好 D. 自身免疫

8. 下列哪项为肝硬化失代偿期的典型表现

- A. 食欲不振 B. 恶心，呕吐
C. 腹水 D. 肝掌

19. 不符合神经衰弱特点的是
- A. 症状多样性
B. 患者无自知力
C. 客观检查无阳性体征
D. 病情波动, 反复迁延
20. 精神分裂症的主要治疗方法是
- A. 药物治疗
B. 工娱治疗
C. 环境治疗
D. 电抽搐治疗
21. 下列哪项是高渗性脱水的特点
- A. 失水多于失钠
B. 失钠多于失水
C. 水潴留
D. 血浆渗透压下降
22. 低钾血症的临床表现不包括
- A. 腹胀、便秘
B. 表情淡漠
C. 腱反射亢进
D. 乏力、甚至软瘫
23. 外科休克中最常见的是
- A. 低血容量性休克和心源性休克
B. 低血容量性休克和感染性休克
C. 过敏性休克和感染性休克
D. 心源性休克和神经性休克
24. ARF 少尿期饮食护理错误的是
- A. 高蛋白饮食
B. 高热量饮食
C. 高维生素饮食
D. 低钾或无钾饮食
25. 心脏骤停后最容易发生的继发性病理变化是
- A. 肺水肿
B. 急性肾衰
C. 脑缺氧和脑水肿
D. 心肌缺氧性损伤
26. 心脏停搏超过多长时间, 中枢神经系统将遗留不可逆的损害
- A. 2~4min
B. 4~6min
C. 8~12min
D. 12~16min

27. 唇周疔肿挤压后出现寒战、高热、头痛、鼻梁部明显肿胀，最后出现昏迷，首先考虑

- A. 毒血症
- B. 脓血症
- C. 蜂窝组织炎
- D. 颅内海绵窦化脓性静脉炎

28. 外伤后施行清创术的最佳时机是

- A. 6~8h
- B. 8~12h
- C. 12~16h
- D. 16~24h

29. 脑挫裂伤的临床表现，正确的是

- A. 伤后可有中间清醒期
- B. 不出现局灶体征
- C. 伤后意识障碍>30min
- D. 生命体征改变不明显

30. 不宜施行甲状腺大部切除术的是

- A. 青少年甲亢
- B. 继发性甲亢
- C. 早、中期妊娠合并甲亢
- D. 中度原发性甲亢

31. 胸膜腔闭式引流排气时，引流管常放置于患侧的

- A. 腋中线与腋后线之间第7~8肋间
- B. 锁骨中线第3~4肋间
- C. 腋前线与腋中线之间第6肋间
- D. 锁骨中线第2肋间

32. 最易发生肋骨骨折的部位是

- A. 第1~3肋
- B. 第4~7肋
- C. 第8~10肋
- D. 第11~12肋

33. 最容易发生嵌顿的疝是

- A. 腹壁切口疝
- B. 股疝
- C. 腹股沟斜疝
- D. 脐疝

34. 溃疡病急性穿孔非手术治疗初期，最重要的护理措施是

- A. 半卧位，严密观察病情变化
- B. 准确记录出入水量
- C. 应用抗生素控制感染
- D. 禁饮食、胃肠减压、输液

44. 肝性脑病治疗时可用碱性溶液灌肠。
45. 肾盂肾炎最常见的感染途径是血行感染。
46. 重型再生障碍性贫血患者常表现为全血细胞减少。
47. 甲状腺肿大与甲亢轻重无明显关系。
48. 类风湿因子阳性，即可诊断为类风湿性关节炎。
49. 内囊病变常引起三偏征。
50. 神经症患者常无精神病性症状。

三、名词解释题（每小题 2 分，共 8 分）

51. 慢性支气管炎
52. 膀胱刺激征
53. 糖尿病
54. 瘵症

四、简答题（每小题 5 分，共 20 分）

55. 简述肺结核大咯血窒息的抢救措施。
56. 简述消化性溃疡腹痛的主要特点。
57. 简述口服铁剂的护理措施。
58. 简述短暂性脑缺血发作的临床特点。

五、综合题（12 分）

59. 患者，男，60 岁，高血压病 10 余年，2 年前有“急性心肌梗死”病史；患者于今夜睡后 2h 突然胸闷、气急、不能平卧，大汗淋漓、端坐呼吸、口唇紫绀，咳嗽、咳粉红色泡沫痰，急诊入院；查体：Bp170/110mmHg，P124 次/min，两肺布满干、湿性啰音和哮鸣音，心率 124 次/min，律齐，心尖部可闻及舒张期奔马律；急查心电图示窦性心动过速，陈旧性广泛前壁心肌梗死，心肌呈缺血性改变。

请问：（1）患者最可能的诊断是什么？

（2）急救措施有哪些？

外科护理学（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60. 高钾血症时使用含钙溶液能缓解 K^+ 对心肌的毒性作用。
61. 休克患者若体温降低，应及时用热水袋等进行局部体表加温。
62. 急性肾衰少尿期的主要死亡原因为低钾血症。
63. 四肢损伤出血患者使用止血带最长不要超过4h，每小时应放松1~2min。
64. 颅底骨折伴脑脊液漏者，应行腰穿减压，避免脑脊液丢失过多。
65. 胸膜腔闭式引流的水封瓶必须低于胸膜腔60cm，以免将水灌入胸腔。
66. 腹部损伤时如遇大量内脏脱出腹腔外，现场应暂时回纳腹腔。
67. 胃肠减压管的护理与一般引流管的护理原则相似。
68. 尿道损伤患者试插导尿管成功导尿后，应固定并留置导尿管2周。
69. 手术复位比手法复位更能促进愈合。

七、名词解释题（每小题2分，共8分）

70. 有效循环血量
71. 脑震荡
72. 急性化脓性腹膜炎
73. 肿瘤

八、简答题（每小题5分，共20分）

74. 简述胸外心脏按压的注意事项。
75. 简述甲状腺大部切除术后常见并发症。
76. 张力性气胸有何临床表现？急救原则是什么？
77. 简述石膏绷带固定后的护理措施。

九、综合题（12分）

78. 患者，女性，45岁，近3年来经常出现上腹部不适，偶有进食后出现右上腹部隐痛，在当地就诊按“胃病”治疗，病情时轻时重。近半年来发作频繁，两天前再次出现右上腹部阵发性疼痛伴寒战、发热、尿黄，经治疗后发热有所好转但仍有右上

腹部疼痛、尿黄，渐出现巩膜、皮肤黄染，来院就诊收入院。查体：一般情况良好，皮肤、巩膜明显黄染，双肺及心脏无异常体征，右上腹部明显压痛，可触及增大胆囊，肝区压痛和叩击痛阳性。B 超检查：胆囊明显增大并多发性结石；肝增大，肝内胆管明显扩张；胆总管直径 14mm。

请问：（1）此患者最可能患何种疾病？

（2）术后放置 T 型引流管的护理措施有哪些？

www.heao.com.cn